Annexe 43. Réaction allergique grave à un vaccin

Réaction allergique grave à un vaccin

Dans les 5 à 30 mn après l'injection,
signes cutanés (rougeur, œdème) associés à :

Etat de choc

Tachycardie, pouls faible,
hypotension

Obstruction des voies aériennes

Visage et langue gonflés, détresse respiratoire, bruit respiratoire

Bronchospasme

Détresse respiratoire, sifflements

Allonger le patient,
jambes surélevées

Installer le patient
en position demi-assise

Injection IM profonde dans la face antéro-latérale de la cuisse,
de 0,01 mg/kg d'**épinéphrine** (**adrénaline**) :
utiliser une ampoule à 1 mg d'épinéphrine/ml
et une seringue de 1 ml graduée en centièmes de ml.

Age	Dose d'épinéphrine
Moins de 6 ans	0,15 ml
6 à 12 ans	0,3 ml
Plus de 12 ans et adulte	0,5 ml

En l'absence d'amélioration, répéter l'injection après 5 minutes

Transférer d'urgence le patient à l'hôpital accompagné d'un agent de santé.

- Si disponible, administrer de l'oxygène.
- Si possible, mettre en place une voie veineuse et administrer :
  NaCl 0,9% ou **Ringer lactate** : 20 ml/kg chez l'enfant < 12 ans
  500 ml chez l'enfant > 12 ans et l'adulte
  Hémisuccinate d'hydrocortisone IV : 2 mg/kg chez l'enfant < 12 ans
  200 mg chez l'enfant > 12 ans et l'adulte

- Noter : signes vitaux (pouls, tension, fréquence respiratoire, etc.), heure d'administration et dose de tous les médicaments utilisés. S'assurer que ces informations sont transférées avec le patient.
- Ecrire sur la carte de vaccination « réaction anaphylactique grave survenue le _____après l'injection du vaccin _____ », afin que l'intéressé ne reçoive plus jamais ce vaccin.